

FMC**KaSe****Kālija un sēra mēslošanas līdzekļa šķīdums.****KaSe. Mēslošanas līdzeklis speciālai lietošanai.****Pamatsastāvs: K₂O 25 %, S 17 %.****DEKLARĒTAIS SATURS:****Kālijs (K₂O): 25% pēc masas, ūdenī šķīstošs, 360 g/l;****Kopējais sērs (S): 17% pēc masas, ūdenī šķīstošs, 250 g/l.****Reakcija: pH 6.8 - 8.****Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.**

KaSe. Kālija trūkums augiem uzreiz neparādās ar redzamām pazīmēm. Kālijs piedalās fotosintēzes procesā, regulē ūdens saturu šūnās, un tāpēc augam ir svarīgs sausuma radīta stresa apstākļos. Augi, kas cieš no kālija trūkuma ir mazāk izturīgi pret salnām, ir iejēnīgāki pret sēnu ierosinātām slimībām un jutīgāki pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju.

Sērs ir nepieciešams slāpekļa vielmaiņai augā un ir svarīgs proteīnu veidošanā. KaSe kā šķidrums ir ideāls līdzeklis augu mēslošanai caur lapām. To var lietot arī kultūraugu mēslošanai, izmantojot laistīšanas sistēmas.

KaSe kā lapu mēslojums var korigēt K nodrošinājumu augiem arī tad, kad to izdarīt ar tradicionāliem K papildmēslojuma līdzekļiem nav iespējams.

KaSe ir jālieto kultūraugiem atbilstoši augsnes un/vai lapu analizēm.

Devas nosaka pēc kālija satura audos.

FORMULĀCIJA.

KaSe ir šķidrums mēslošanas līdzeklis. KaSe nesatur hloru. KaSe paliks šķīdumā līdz 0°C.

Nelietot KaSe kultūraugiem, kuri ir jutīgi pret sēru.

Ābeļiem, bumbierēm, plūmēm un ķiršiem atsevišķām šķirnēm sērs var būt fitotoksisks. Pirms apstrādes veikšanas jāizmēģina uz neliela augu skaita.

LIETOŠANAS DEVAS: 3–6 l/ha, ūdens patēriņš - vismaz 200 l/ha, ja etiķetē nav norādīts savādāk (skat. "Pielietošana").

PIELIETOŠANA.

Kartupeļi. Pirmo reizi, bumbuļu veidošanās sākumā, otro reizi 2-3 nedēļas vēlāk.

Trešo reizi bumbuļu piebriešanas laikā.

Graudaugiem.

No cerošanas sākuma līdz karoglapas maksts piebriešanas fāzei (AS 21-43).

Ziemas un vasaras rapsis. Lieto, kad stublājs strauji aug garumā.

Kāpostveidīgie. Lieto, kad ir strauja augu augšana.

Kukurūza. Lieto, kad ir strauja augu augšana.

Tauriņziežiem. Pielieto pumpuru stadijā, līdz 10 % ziedi atvērušies.

Tomātiem. Pielieto, kad aizmetušies pirmie augļi, atkārtο ar 10-14 dienu intervālu.

Vīnogām. Pirmo miglojumu veic 2 nedēļas pēc ziedēšanas, atkārtο ar 7-10 dienu intervālu.

Lieto ar vismaz 500 litriem ūdens uz ha.

Ābeļiem. Lieto ar vismaz 900 litriem ūdens uz ha. Pirmo reizi, kad pirmās lapas izaugušas, atkārtο pēc nepieciešamības.

Zālāji, zāieni un golfa laukumi. KaSe var tikt plaši pielietots šajās kultūrās ar devu 30 litri uz ha, ar vismaz 800 litriem ūdens, atkārtο pēc nepieciešamības. Par sīkāku informāciju kontaktēties ar izplatītāju.

Dārzenu, augu koku, dekoratīvo kultūru, skuju un lapu koku mēslošanai, izmantojot laistīšanas sistēmas. KaSe var tikt plaši pielietots kultūrās, kuru audzēšanā tiek izmantotas laistīšanas sistēmas, ar devu 30-50 litri uz ha. Atkārtο pēc nepieciešamības. Par sīkāku

informāciju kontaktēties ar izplatītāju.

BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst apstrādāt augus stresa apstākļos (citu preparātu izraisīti bojājumi, salnas, ļoti augsta temperatūra u.c. stresa apstākļi).

Kultūraugi var ciest no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, nepareizas produkta pielietošanas, kas ir ārpus ražotāja vai izplatītāja kontroles un atbildības. Vienmēr pirms produkta lietošanas rūpīgi jāizlasa etiķete un neskaidribu gadījumā jākonsultējas pie izplatītāja.

DARBA ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA:

Uzpilda tvertni līdz pusei, ieslēdz maisītāju, pievieno nepieciešamo produkta daudzumu un piepilda nepieciešamo ūdens daudzumu. Maisītajam jābūt ieslēgtam kā darba šķidruma sagatavošanas, transportēšanas, kā arī miglošanas laikā.

SAVIETOJAMĪBA: KaSe ir fiziski savietojams ar daudziem citiem mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļiem. Konsultējieties pie konsultantiem pēc jaunākās informācijas un rekomendācijām par savietojamību. Audzēšanas un laika apstākļu dažādības dēļ nav iespējams sniegt vispārīgas rekomendācijas par savietojamību.

Tvertnes maisījumos ar KaSe pH nedrīkst būt mazāks par pH 6.

UZGLABĀŠANA. KaSe jāuzglabā oriģinālā slēgtā iesaiņojumā, temperatūrā virs +5°C.

Nepieļaut sasaļšanu. Neglabāt tiešos saules staros.

Drošības pasākumi.

Sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši noslēgtu. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Strādāt aizsargcimdos, valkāt acu un sejas aizsegu.

Atlauja Nr. 06-20

***Augu Audzēšanas Serviss* SIA**
Lielvārdes iela 41, Rīga, LV-1006
Latvija T.: 67541995

Augu Audzēšanas Serviss

Ražots: Apvienotā Karaliste

Partijas Nr.: Skatīt uz iepakojuma

Tilpums: 10 litri**Neto: 14,6 kg****Iepakojums: 2 x 10 Litri (2 x 14,6 kg)**

5 1703265 1561082

FMC

FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

www.fmc-agro.co.uk

15097196
15042020