



# NiCa

## Kalcija nitrāta šķidums ar magniju, boru un cinku

### EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

Tips: C 1.3.

Kalcija nitrāta šķidums ar magniju, boru un cinku.  
Lapu mēslošanas līdzeklis. NiCa ir joti labi šķīstošs šķidums.

### DEKLARĒTAIS SATURS:

Kopējais slāpekļiks (N)	10,0%	pēc masas,	149 g/l
Kalcījs (Ca)	10,7%	pēc masas,	160 g/l
Magnījs (Mg)	1,2%	pēc masas,	18 g/l
Mikroelementi			
Bors (B)	0,05%	ūdeni šķīstošs,	0,75 g/l
Cinks (Zn)	0,02%	ūdeni šķīstošs,	0,3 g/l

Reakcija pH 2.0-3.5

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā.

Nepārsniegt attiecīgas devas.

Kalcijus augiem nepieciešams šūnapvalku veidošanai, jauno dzinumu, sakņu un to spurgalīnu attīstībai; tas aizkavē augu novecošanās procesus un ir joti būtisks augļu kvalitātei un uzglabāšanai.

### LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

#### Ābeles:

Kalcija trūkums izpaužas fizioloģisko traucējumu veidā: mikstuma brūnēšana, zemmirzas rūgtā korkplankumainība, mizas brūnēšana, stiklplankumainība, lenticulu plankumi. Kalcija trūkumā augļu kokiem lēnāk dzīst grieztu zaru vietas un citi mehāniskie bojājumi.

**Lieto 2-5 l/ha,** pampuru plaušanas un ziedēšanas sākumā, atkārtot jk pēc 7-10 dienām.

**Lieto 5-10 l/ha,** no ziedlapu bīrsānas līdz apmēram vienai nedēļai pirms ražas novākšanas, atkārtot jk pēc 10-14 dienām, pēc nepieciešamības.

Ūdens daudzums: 200-500 l/ha, atkarībā no vairāna lieluma.

Izvairīties no miglošanas augstā temperatūras apstākļos. Ja temperatūra pārsniedz 21°C un miglošanu nevar atlīkt, izmantot mazāku devu un veikt miglošanu biežāk, lai sasniegtu ieteicamo devu. Miglošana agrā pievākarē var samazināt apdeguma risku. Jaunās lapas ir jutīgākas.

**Zemenes.** Lai uzbaltu ogu stingrumu un glabāšanos.

Profilaktiski **lieto 2,5 l/ha.** Defīcta apstākļos **lieto 5,0 l/ha.** Pielietot no ziedēšanas sākuma. Atkārtot jk pēc 10-14 dienām, pēc nepieciešamības. Udens daudzums: 500-1000 l/ha.

#### Kartupeļi.

**Lieto 5,0 l/ha,** lai samazinātu kalcija defīcīta ietekmi. Apstrādi atkārtot jk pēc 10-14 dienām, pēc nepieciešamības. Izmantot pietiekšķi udens daudzumu, lai nokļautu laktus.

#### Rapsis.

Profilaktiski **lieto 2,0 - 3,0 l/ha** ziedpumpuru veidošanās sākumā līdz ziedēšanas sākumam. Ūdens daudzums: vismaz 200 l/ha.

**Kāpostaugi:** ziedkāposti, galvīnkāposti, Kīnas salāti, Briseles kāposti.

Profilaktiski **lieto 5,0 l/ha,** atkārtot jk pēc 7-10 dienām. Ūdens daudzums: vismaz 200 l/ha

#### Burkāni un Selerījas.

**Lieto 5,0 l/ha.** Burkāniem kalcija defīcīta novēršanai, atkārtot jk pēc 10-14 dienām, pēc nepieciešamības. Kātu selerījām lieto tīklīdz izveidojušas jaunās lapas, lai būtu absorbcijas virsma. Ūdens daudzums: vismaz 200 l/ha.

#### Miglošanas apstākļi.

Lai veicinātu lapu mēslojumu efektivitāti, apstrādi labāk veikt agri no rīta vai vakarā. Nelietot NiCa specīgas saules laikā vai pie temperatūras virs +25°C.

#### Darba šķidruma sagatavošana.

Pirms lietošanas kannu rūpīgi sakratīt! Piepildīt miglotāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni

un ieslēgt maisītāju. Pievienot nepieciešamo NiCa daudzumu un atlikušo ūdens daudzumu. Izskalot kannu rūpīgi un skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma pagatvošanai. Neizslēgt maisītāju visā pārbraukšanas un miglošanas laikā. Pēc miglošanas rūpīgi izmazgāt miglotāju.

#### Saviejojamība.

NiCa ir saviejojams ar daudziem produktiem. Konsultēties ar izplatītājiem par tvertnes maišumiem. Vienmēr rūpīgi iepazīstieties ar partner-produktu informāciju, pirms pievienot NiCa.

#### Uzglabāšana.

Sargāt no salāt **Uzglabāšanas temperatūra augstāka par +5°C.** **Uzglabāt vēsa, labi vēdināmā telpā.** Neuzglabāt produktu tiesā saulē vai apsildes virsmu tuvumā. Jāuzglabā bēriem nepieejamā vietā. Glabāt atsevišķi no pārīkā produktiem, dzērieniem un lopbarības.

#### Drošības pasākumi.

**H302** Kaitīgs jā norīj.

**H318** Izraisīta nopietnīta acu bojājums.

#### Draudi

**P264** Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

**P280** Izmantot aizsargcīmdu/saļzargapģērbu/acu aizsargu/ sejas aizsargus.

**P301+310 NORĀDĀS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazināties ar SAINEŠĀNĀS CENTRU vai ārstu.

**P305+351+338 SASKARE AR ACĪM:** uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja tās ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

Bistamās sastāvdājas: CALCIUM AMMONIUM NITRATE  
Ražotās: Apvienotā Karaliste  
Partijas Nr.: skāti marķējumu uz pudeles kakla.



## Tilpums: 10 litri

Neto: 15 kg  
Iepakojums: 2 x 10 Litri (2 x 15 kg)

#### Ievedējs :

**"Augu Audzēšanas Serviss" SIA**

Lielvārdes iela 41,  
Riga, LV-1006

Latvija, t. : 67541995

Tips: C1.3

**Augu Audzēšanas Serviss**



FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

[www.fmc-agro.co.uk](http://www.fmc-agro.co.uk)

15096784  
09042020