

Riza® 250 EW
Fungicīds

Plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds miltrasu, plankumainību, rūsu un citu slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles, auzu sējumos. Krustziežu sausās puves, krustziežu sausplankumainības, gaišplankumainības, baltās puves apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.

Darbīgā viela: tebukonazols 250 g/l

Preparatīvā forma: emulsija ūdenī

Reģistrācijas Nr. 0352.

Reģistrācijas klase: 2.

Iepakojums: 4 x 5L

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma



Bīstami

H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H360 D: Var kaitēt nedzimušajam bērnam.

H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401: Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P264: Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbas/ acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P308+ P313: Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīnu palīdzību.

P337+ P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.

P501: Atbrīvojoties no tvertnes/satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1: Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Neīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3: Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana. Glabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C, nepieļaut sasalšanu.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese:

Cheminova A/S

Thyborønvej 76–78,

DK-7673,

Harboøre, Dānija.

FMC pārstāvis Baltijas valstīs: + 370 644 80 744; +370 614 25 433 (ENG/RUS)

Preparāta izplatītājs Latvijā:

Augu Audzēšanas Serviss” SIA,

Lielvārdes iela 41, Rīga, tālr. 67541995, Latvija

Riza® 250 EW
Fungicīds

Plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds miltrasu, plankumainību, rūsu un citu slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles, auzu sējumos. Krustziežu sausās puves, krustziežu sausplankumainības, gaišplankumainības, baltās puves apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.

Darbīgā viela: tebukonazols 250 g/l

Preparatīvā forma: emulsija ūdenī

Reģistrācijas Nr. 0352.

Reģistrācijas klase: 2.

Iepakojums: 5L

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma



Bīstami

H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H360 D: Var kaitēt nedzimušajam bērnam.

H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401: Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P264: Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbas/ acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P337+ P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P308+ P313: Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

P501: Atbrīvojoties no tvertnes/satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1: Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3: Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana. Glabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C, nepieļaut sasalšanu.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese:

Cheminova A/S

Thyborønvej 76–78,

DK-7673,

Harboøre, Dānija.

FMC pārstāvis Baltijas valstīs: + 370 644 80 744; +370 614 25 433 (ENG/RUS)

Preparāta izplatītājs Latvijā:

Augu Audzēšanas Serviss” SIA,

Lielvārdes iela 41, Rīga, tālr. 67541995, Latvija

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti ar ūdeni, un izdzert 100 ml ūdens. Neizraisīt vemšanu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti ar ūdeni, un izdzert 100 ml ūdens. Neizraisīt vemšanu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratoru, aizsargbrilles, ķīmiski necaurlaidīgus cimdus un slēgtus gumijas apavus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbus un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

Darbavietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim.

Riza® 250 EW

Plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds miltrasu, plankumainību, rūsu un citu slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles, auzu sējumos. Krustziežu sausās puves, krustziežu sausplankumainības, gaišplankumainības, baltās puves apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.

Riza® 250 EW ātri tiek uzņemts ar auga asimilējošajām daļām. Riza® 250 EW pārvietojas augā virzienā uz augšu pa vadaudu sistēmu. Šāda sistēmiska iedarbība nodrošina labu darbīgas vielas izplatīšanos pa auga audiem un pasargā to no noskalošanās. Lai gan tebukonazola bioloģiskais iedarbības mehānisms pieļauj aizsargājošu un ārstējošu lietošanu, vislabākos rezultātus var sasniegt, ja preparātu pielieto tad, kad slimība ir aktīvā, bet vēl agrīnā attīstības stadijā.

Kultūraugu izturība: Lietojot saskaņā ar rekomendācijām, un kultūraugiem labvēlīgos augšanas apstākļos Riza® 250 EW labi panes visas kultūras.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Kaitīgais organisms	Kaitīgā organisma latīniskais nosaukums	Kultūraugs
Kviešu plēkšņu plankumainība	<i>Septoria nodorum</i>	Kvieši, tritikāle
Kviešu lapu pelēkplankumainība	<i>Septoria tritici</i>	Kvieši, tritikāle
Kviešu dzeltenplankumainība	<i>Drechslera tritici-repentis</i>	Kvieši
Graudzāļu miltrasa	<i>Erysiphe graminis</i>	Labības
Dzeltenā rūsa	<i>Puccinia striiformis</i>	Kvieši, rudzi, tritikāle
Brūnā rūsa	<i>Puccinia recondita</i>	Kvieši, tritikāle
Miežu pundurrūsa	<i>Puccinia hordei</i>	Mieži
Auzu pelēkplankumainība	<i>Stagonospora avenae</i>	Auzas

Miežu lapu tīklplankumainība	<i>Pyrenophora teres</i>	Mieži
Melnais sordējums	<i>Cladosporium, Alternaria</i>	Kvieši, rudzi, tritikāle
Stiebrzāļu gredzenplankumainība	<i>Rhynchosporium secalis</i>	Mieži, rudzi, tritikāle
Vārpu fuzariozes	<i>Fusarium spp.</i>	Kvieši, rudzi, tritikāle
Baltā puve	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Rapsis
Krustziežu sausā puve	<i>Phoma lingam</i>	Rapsis
Krustziežu sausumplankumainība	<i>Alternaria brassicae</i>	Rapsis
Krustziežu giasplankumainība	<i>Pyrenopeziza brassicae</i>	Rapsis

Riza[®] 250 EW ieteicams lietot profilaktiski vai parādotes pirmajām slimības pazīmēm. Ja slimības infekcija turpinās vai parādās jauna slimība, smidzināšana jāatkārto pēc trīs līdz četrām nedēļām.

Vasaras un ziemas kvieši, rudzi un tritikāle: 1,0 l/ha sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 29 - 69). Pret vārpu fuzariozi - sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61 - 69).

Vasaras un ziemas mieži, auzas: 1,0 l/ha sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 29 - 60).

Ziemas un vasaras rapsis: 1,0 l/ha; krustziežu sausās puves, krustziežu gaišplankumainības un krustziežu sausumplankumainības apkarošanai, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam, parādotes slimības pirmajām pazīmēm (AS 14- 65). Baltās puves apkarošanai apstrādāt pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65).

Baltās puves apkarošanai miglot, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi (pēc prognozes).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: graudaugos, ziemas un vasaras rapsī - 2 reizes. Ziemas rapsim 3 reizes, ja viena no tām tiek veikta rudenī.

Nogaidīšanas laiks: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, auzas, rudzi, tritikāle – 35 dienas, ziemas un vasaras rapsis – 56 dienas.

Ūdens patēriņš: 200 - 400 l/ha.

Vēlamais bezlietus periods pēc apstrādes ar preparātu: 1 stunda

DARBA ŠKIDRUMA SAGATAVOŠANA

Izmantojiet ūdeni - vismaz +10 °C. Ūdenim jābūt šajā temperatūrā pirms tiek pievienots Riza[®] 250 EW Smidzinātājā ielej 1/2 – 3/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto[®] 250 EW daudzumu, tad ielej pārējo ūdeni. Jāsagatavo, tikai tik daudz darba šķidruma, cik ir nepieciešams darbam, un nedrīkst atstāt sagatavotu darba šķidrumu pa nakti. Ja smidzināšana ir jāpārtrauc uz īsāku laiku, piemēram, uz dažām stundām, atstājiet maisītāju ieslēgtu uz visu šo laiku. Pēc lietošanas smidzinātājs tūlīt jāizmazgā vismaz ar tīru ūdeni.

Lietošanas tehnika: Izmanto smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu, atkarībā no sprauslas darba leņķa. Augus nedrīkst smidzināt, ja augi ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus. Nesmidzināt dienas karstajās stundās. Minimālā temperatūra fungicīda efektivitātes nodrošināšanai +12°C.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM

Ja ir nepieciešamība gatavot tvertnes maisījumu ar citu produktu, jālieto ūdens siltāks kā +10°C. Vienmēr pārlicinieties, ka Riza[®] 250 EW. tiek pievienots pirmais un ir labi izšķīdis, pirms tvertnē tiek pievienots partnerprodukts. Negatavojiet tvertnes maisījumus ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir fluroksipīrs, alfa-cipermetrīns. Ja preparātu grib lietot maisījumos, neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmu pārstāvniecībās.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izsakt ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet miglotājā un izmantot darba šķidrums pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā to var savākt, apberot ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķīmikālijām piesūkušos materiālu vai augsnes slāni savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Preparāts jāuzglabā slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, noslēdzamā, labi vedināmā noliktavā, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības.

Uzglabāšanas t° no 0°C līdz $+35^{\circ}\text{C}$, nepieļaut sasalšanu.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.